レジメン名	（前立腺癌）カバジタキセル	適応	前立腺癌
		１クール日数	２１日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量＼day	1						7	8						14	15						21
≪主管①≫ 生理食塩液【100】mL 点滴注射	1 瓶	●																				
＜側管①＞ デキサート注射液【6.6】mg･2mL/管 ファモチジン静注20mg・20mL/管 ポララミン注5mg・1mL/管 生理食塩液【50】ｍＬ/瓶 30分かけて ジェブタナ投与30分前まで 点滴注射	1 瓶 1 管 1 管 1 瓶	●																				
＜側管②＞ **■ジェブタナ点滴静注（60）** 生理食塩液（100/250/500） 添付溶解液全量で溶解し、10mg/mLのプレミックス液とする。必要量を抜き取り、最終濃度を0.10～0.26mg/mLになるよう以下の量で希釈する。 ジェブタナ投与量<25mg：100mL 25～65mg：250mL >65mg：500mL 1時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	**25mg/m2** 1 袋・瓶	●																				
フィルター付輸液セット		●																				
＜側管③＞ 生理食塩液【５０】ｍＬ/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用	1 瓶	●																				

【内服】	投与量＼day	1						7	8						14	15						21
プレドニゾロン錠 5ｍｇ 1日2回　朝昼　食後 初回は帰宅後に10mg(2錠)服用（外来で行う場合）	2 錠	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

泌/化療/≦2h