

レジメン名	【ショートハイドレーション】	適応	胃癌
	(胃癌) エスワン+シスプラチン	1クール日数	35日
		上限クール数	なし

※シスプラチン投与前日 (Day 7) から投与翌日 (Day 9) まで、1日1000mL以上 (推奨: 1500mL) の 飲水をお願いします。【経口補水液OS-1が推奨される】

【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
<<主管理①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射 1 瓶									●																													
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/管(デ'ト'ロ) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デ'ト'ロ) アロキシ注射液 0.75mg/管 生理食塩液 100mL/袋 30分かけて 点滴注射 1 管 1 管 1 管 1 袋									●																													
<側管②> デノサリン 1500mL/袋 KCL注20mEqキット1mEq/mL 1時間かけて 点滴注射 1 袋 0.5 本									●																													
<側管③> デノサリン 1500mL/袋 硫酸Mg 補正液20mEq・20mL/管 1時間かけて 点滴注射 1 袋 0.5 管									●																													
<側管④> マンニトール注射液20%/300mL/瓶 30分かけて 点滴注射 1 瓶									●																													
<側管⑤> ■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (10/25/50) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 60mg/m2 1 袋									●																													
<側管⑥> デノサリン 1500mL/袋 1時間かけて 点滴注射 1 袋									●																													
<側管⑦> デノサリン 1500mL/袋 KCL注20mEqキット1mEq/mL 1時間かけて 点滴注射 1 袋 0.5 本									●																													

【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
■エスワン [®] 1日2回 朝 夕 食 後 mg		●	●																																			

エスワン	
体表面積	初回基準量
~1.25m2未満	40mg/回 (×2)
1.25m2以上~1.5m2未満	50mg/回 (×2)
1.5m2 以上~	60mg/回 (×2)

胃/化療/7h≤

【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後 2 錠									●	●	●																											
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前 1 C									●																													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食 後 1 C									●	●																												