

レジメン名	(多発性骨髄腫)KRd療法	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	12

【注射】		投与量\day	1	2	8	9	15	16	22	23	28
<<主管①>> 5%ブドウ糖液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●	●		●	●		●	●	
<側管①> ■カiproリス点滴静注用(10/40) 注射用水【100】mL/瓶 5%ブドウ糖液【50】mL/瓶 10分かけて 1バイアルあたり20mL(40mg製剤)もしくは 5mL(10mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を 5%ブドウ糖液へ希釈する。 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)閉鎖式	初回day1, 2 20mg/m ² 以降 27mg/m ² 1瓶 1瓶										
<側管②> 5%ブドウ糖液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●	●		●	●		●	●	

【内服】		1	2	8	9	15	16	21	22	23	28	
レナデックス錠 4mg 1日1回 朝食後	10錠	●		●		●		●				
レブラミドカプセル5mg 1日1回 朝食後	5錠	●	→									

day1のレナデックス錠、レブラミドカプセルは院内処方