

レジメン名	(大腸癌) SIR+ベバシズマブ	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●																				
<側管①> ■アバステン点滴静注用(100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 初回の忍容性が良ければ、2回目以降は60分、 3回目以降は30分で投与可能。 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）*45	7.5mg/kg 1 瓶		●																				
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 アバステンの後 点滴注射	1 瓶		●																				
<側管③> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 管 1 管 1 瓶 1 瓶		●																				
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 イリノテカンの前 点滴注射	1 瓶		●																				
<側管⑤> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイナ」 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）閉鎖式	150mg/m2 1 袋		●																				
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 イリノテカンの後 点滴注射	1 瓶		●																				

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1 錠		●																				
アレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1 錠		●	●																			

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
■エスワンタイホウ配合OD錠 1日2回 朝 夕 食後	mg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

エスワン	
体表面積	初回基準量
~1.25m2未満	40mg/回(×2)
1.25m2以上~1.5m2未満	50mg/回(×2)
1.5m2 以上~	60mg/回(×2)

腸/化療/≤5h