

レジメン名	(胃癌) CAPOX	適応	胃癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●																				
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ラモセトロン注射液 0.3mg・2m 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1瓶		●																				
<側管②> ■オキサリプラチン注 (50/100) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製)	130mg/m ² 1管 1瓶		●																				
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●																				

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
■カペシタビン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食後	mg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ピドキサール錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食後	3錠		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食後	2錠		●	●																			

ピドキサール錠は、主治医の判断

胃/化療/≤3h

体表面積	1回用量
~1.36m ² 未満	1,200mg/回 (×2)
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1,500mg/回 (×2)
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1,800mg/回 (×2)
1.96m ² 以上~	2,100mg/回 (×2)