

レジメン名	(大腸癌) イリノテカンB法	適応	大腸癌
		1クール日数	35日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用 点滴注射	1瓶	●														●																				
<<側管①>> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1管 1瓶	●														●																				
<<側管②>> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●														●																				
<<側管③>> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイウ」 (40/100) テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	150mg/m2 1袋	●														●																				
<<側管④>> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●														●																				

腸/化療/≤3h

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C	●														●																				
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1C		●	●													●	●																		