

レジメン名	(大腸癌) sLV5FU2	適応	大腸癌
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射	1瓶	●														
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射	1瓶 1瓶	●														
<側管②> ■レボホリナート点滴静注用 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 中心静脈注射（薬剤部調製）	200mg/m ² 1瓶	●														
<側管③> ■フルオロウラシル注（5-FU） 側管②終了後 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）	400mg/m ²	●														
<側管④> ■フルオロウラシル注（5-FU） 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入（薬剤調製）	2400mg/m ² 0.6瓶	●●														
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 静脈内注射	1管	●														
ヘミロック [®] リンロック用 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 静脈内注射	1筒	●														

腸/化療/≤3h