

レジメン名	(大腸癌) パニツムマブ+mFOLFOX6	適応							大腸癌							
		1クール日数							14日							
		上限クール数							なし							
【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<側管①> ■ベクティビックス点滴静注用 (100) 生理食塩液【100】mL/瓶 60分かけて 抗癌剤中心静脈注射 (薬剤調製)		6mg/kg 1 瓶	●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<側管③> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ラモセトロン注射液 0.3mg・2mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射		1 瓶 1 管 1 瓶	●													
<側管④> ■オキサリプラチン注 (50/100) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射 (薬剤調製)		85mg/m ² 1 管 1 瓶	●													
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
<<主管②>> ■レボホリナート点滴静注用 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 主管①と付け替え、側管④と同時に開始 中心静脈注射 (薬剤部調製)		200mg/m ² 1 瓶	●													
<側管⑥> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 主管②側管④終了後 抗癌剤中心静脈注射 (薬剤調製)		400mg/m ²	●													
<側管⑦> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入 (薬剤調製)		2400mg/m ² 0.6 瓶	●	●												
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 中心静脈注射		1 管	●													
生理食塩液 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射		1 筒	●													
フィルター付輸液セット			●													
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 食 後		2 錠		●	●											

腸/化療/≤4h