レジメン名	（大腸癌）セツキシマブ＋イリノテカン 毎週投与２クール目以降	適応	大腸癌
		１クール日数	４２日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量＼day	1	7	8	9	10	14	15	16	17	21	22	28	29	35	36	42
≪主管①≫ 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 キープ用 点滴注射	１ 瓶	●		●				●				●		●		●	
＜側管①＞ デキサート注射液【3.3】mg･1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg･0.5mL/管 アロキシ静注0.75mg･5mL/瓶 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 30分かけて 点滴注射	１ 管 １ 管 １ 瓶 １ 瓶	●		●				●				●					
＜側管②＞ 生理食塩液【５０】ｍＬ/瓶 フラッシュ用 点滴注射	１ 瓶	●		●				●				●					
＜側管③＞ **■アービタックス注射液(100)** テルモ生食【250】mL/袋 1時間かけて ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ投与後１時間経過観察 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	**250mg/m2** １ 袋	●		●				●				●		●		●	
＜側管④＞ 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 経過観察用 1時間かけて 点滴注射	１ 瓶	●		●				●				●					
＜側管⑤＞ **■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ﾀｲﾎｳ」(40/100)** テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 90分かけて 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	**100mg/m2** １ 袋	●		●				●				●					
＜側管⑥＞ 生理食塩液【５０】ｍＬ/瓶 フラッシュ用 点滴注射	１ 瓶	●		●				●				●		●		●	

【内服】	投与量＼day	1	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	21	22	23	24	28	29	35	36	42
レスタミンコーワ錠　１０ｍｇ 医師の指示通り（頓服用） 早急 アービタックス開始６０分前までに内服	５ 錠	●				●				●				●				●		●	
アプレピタントカプセル　１２５ｍｇ １日１回 点滴の６０～９０分前	１Ｃ	●				●				●				●							
アプレピタントカプセル　８０ｍｇ １日１回 朝　　食　後	１Ｃ		●	●			●	●			●	●			●	●					