2020/3/10

レジメン名	（マントル細胞リンパ腫）ベンダムスチン	適応	マントル細胞リンパ腫
		１クール日数	２１日
		上限クール数	６クール

【注射】	投与量＼day	1	2	3	7	8	14	15	21
《主管①》 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	１瓶	●	●						
＜側管①＞ デキサート注射液【3.3mg】mg･1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg･0.5mL/管 アロキシ注射液0.75ｍｇ/管 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 30分かけて 点滴注射	１管 １管 １管 １瓶	●							
＜側管②＞ 生理食塩液【５０】ｍＬ/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	１瓶	●	●						
＜側管③＞ **■トレアキシン注(100)▼限定** 注射用水【１００】mL/瓶 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 1ﾊﾞｲｱﾙあたり40mL(100mg製剤)もしくは10mL(25mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を生食へ希釈する。 抗癌剤精密持続点滴注射（薬剤部調製）	**120mg/m2** １瓶 １袋	●	●						
＜側管④＞ 生理食塩液【５０】ｍＬ/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	１瓶	●	●						
＜側管①＞ デキサート注射液【3.3mg】mg･1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg･0.5mL/管 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 30分かけて 点滴注射	１管 １管 １瓶		●						

【内服】	投与量＼day	1	2	3	7	8	14	15	21
アプレピタントカプセル　１２５ｍｇ １日１回　点滴の６０～９０分前	１錠	●							
アプレピタントカプセル　８０ｍｇ １日１回　朝　　食　後	１錠		●	●					

アシクロビル･バクタは主治医の判断で内服