

07/18

レジメン名	(悪性リンパ腫) リツキシマブ単独	適応		悪性リンパ腫							
		1クール日数		7日							
		上限クール数		8クール							
【注射】		投与量\day		1	2	3	4	5	6	7	
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射		1 瓶		●							
<側管①> ■ リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に 50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2 回目以降は、初期投与時の副作用が軽微で あれば、100mg/hrで開始し、30分毎に 100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減 速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)		375mg/m2 0.001 mL		●							
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1 瓶		●							
【内服】		投与量\day		1	2	3	4	5	6	7	
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)		2 錠		●							
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)		3 錠		●							

血/化療/≤5h