

レジメン名	(乳癌)ペルツズマブ+トラスツズマブ+(他レジメンと併用)	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

※ 化学療法薬と併用の場合は本レジメンを先に施行する。

【注射】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●																			
<側管①> ■パージェタ注 (420) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は1時間かけて 2回目以降は30分 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body 1袋	●																			
<側管②> 生理食塩液【100】mL/瓶 初回は1時間かけて 2回目以降は30分(経過観察用) 点滴注射	1瓶	●																			
<側管③> ■トラスツズマブ点滴静注 (60/150) 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は90分かけて 2回目以降は30分 60mgパ イルは3.0mL、150mgパ イルは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 1~2管 1袋	●																			
<側管④> 生理食塩液【100】mL/瓶 初回は1時間かけて 2回目以降は30分(経過観察用) 点滴注射	1瓶	●																			
【内服】		投与量\day		1					7	8											21
フロベン錠 40mg セレスターナ配合錠(セシタミン錠) 医師の指示通り(頓服用) 早急 パージェタ開始30分前に内服	1錠 1錠	●																			

初回：乳/化療/≤5h

2回目以降：乳/化療/≤3h