

レジメン名	(乳癌) EC (90/600)	適応		乳癌												
		1クール日数		21日												
		上限クール数		10クール												
【注射】		投与量\day	1					7	8			14	15			21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射		1 瓶	●													
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカト) 1 瓶 デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカト) 1 管 アロキシ注射液 0.75mg/管 1 管 生理食塩液【100】mL/瓶 1 瓶 30分かけて 点滴注射			●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射			●													
<側管③> ■エピルピシン塩酸塩注射用「NK」 (ファルモピシ) (10/50) 90mg/m ² 大塚糖液【5% 100mL】/瓶 1 瓶 15分かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製)			●													
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射			●													
<側管⑤> ■エンドキサン注 (100/500) 600mg/m ² デノサリン1 500mL/袋 1 袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製)			●													
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射			●													
【内服】			1	2	3	4		7	8			14	15			21
デカドロン錠 0.5mg 1日2回 朝 夕 食 後		16錠		●	●	●										
【内服】			1	2	3	4		7	8			14	15			21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前		1錠	●													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食 後		1錠		●	●											

乳/化療/≤3h