2020/3/10

レジメン名	（悪性神経膠腫）テモゾロミド　2クール目以降	適応	悪性神経膠腫
		１クール日数	２８日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量＼day	1	2	3	4	5	6														28
≪主管①≫ 生理食塩液【１００】ｍＬ/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶	●	●	●	●	●															
＜側管①＞ アロキシ静注0.75mg･5ｍＬ/瓶 生理食塩液【50】ｍＬ/瓶 点滴注射 15分かけて	1 瓶 1 瓶	●																			
＜側管②＞ **■テモダール点滴静注用(100)** 注射用水【100】ｍＬ/瓶 注射用水【20】ｍＬ/瓶 テルモ生食【250】ｍＬ/袋（点滴用） 90分かけて ※1ﾊﾞｲｱﾙを注射用水41mLで溶解。 その後生食250mLに希釈して投与。 抗癌剤点滴注射（薬剤調製）	**200mg/m2** 1 瓶 2 瓶 1 袋	●	●	●	●	●															
＜側管③＞ 生理食塩液【５０】ｍＬ/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●	●	●	●	●															

脳/化療/≦2h