

レジメン名	(卵巣癌) T J	適応	卵巣癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	6クール

【注射】		投与量\day	1	5	8	12	15	21	28
《主観①》									
テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) ケモ用キープ 点滴注射	1袋	●							
<側管>									
デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカト) デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管(デカト) アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液 250mL/袋 パクリタキセル投与30分前までに投与を終了すること 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1瓶 1管 1袋	●							
<側管>									
■パクリタキセル注「NK」(タキソール) (30/100) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 3時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	175mg/m2 1袋	●							
フィルター付輸液セット		●							
<側管>									
生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 パクリタキセルの後 カルボプラチンの前	1瓶	●							
<側管>									
■カルボプラチン点滴静注液「NK」 (パワラチン)(50/150/450) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	AUC5 1瓶	●							
<側管>									
生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 カルボプラチンの後	1瓶	●							
ノイトロジン注 100μg/瓶(溶解付) 皮下注射	1瓶			●	●	●	●		
【内服】	投与量\day	1	2	5	8	12	15	21	28
レスタミンコワ錠 10mg パクリタキセル投与60分前に内服	5錠	●							
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C	●							
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1C		●	●					

卵/化療/≤6h