

レジメン名	(マクログロブリン血症) R-ベンダムスチン (BS:リツキシマブ)	適応		マクログロブリン血症								
		1クール日数		28日								
		上限クール数		6クール								
<b>【注射】</b>		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶	●	●									
<側管①> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 アロキシ注射液0.75mg/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1管 1瓶	●										
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●	●									
<側管③> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m2 0.001	●										
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●	●									
<側管⑤> ■トリアキシシン注(100)▼限定 注射用水【100】mL/瓶 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 1バイアルあたり40mL(100mg製剤)もしくは10mL(25mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を生食へ希釈する。 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	90mg/m2 1瓶 1袋	●	●									
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●										
<側管①> デキサート注射液【3.3mg】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65mg】mg・0.5mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶		●									
<b>【内服】</b>		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠	●										
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠	●										
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠	●										
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1錠		●	●								

アシクロビル・バクタは主治医の判断で内服