

レジメン名	(大腸癌) カペシタビン+ベバシズマブ	適応	大腸癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●																				
<側管①> ■アバステン点滴静注用 (100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 初回の忍容性が良ければ、2回目以降は60分、 3回目以降は30分で投与可能。 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)*45	7.5mg/kg 1瓶		●																				
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●																				

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
■カペシタビン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食後	mg		●	●																			
ピドキサル錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食後	3錠		●	●	●																		

ピドキサル錠は、主治医の判断で必要に応じて服用します。
 腸/化療/≤2h

体表面積	1回用量
~1.36m ² 未満	1,200mg/回 (×2)
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1,500mg/回 (×2)
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1,800mg/回 (×2)
1.96m ² 以上~	2,100mg/回 (×2)