

レジメン名	(潰瘍性大腸炎) インフリキシマブ初回導入	適応	潰瘍性大腸炎
		1クール日数	5 6 日
		上限クール数	なし

本剤の投与中あるいは、投与終了後2時間以内に発現するインフュージョンリアクションが発現した場合は、点滴を止め30分程度観察を行なう。症状が治まらない場合・重篤に移行すると思われる場合は、直ちにサクシゾン注100mg～300mgの投与を考慮する。また、次回投与時は前投薬としてサクシゾン注の使用を考慮する。

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1 瓶		●				●			
＜側管①＞ ■インフリキシマブBS 点滴静注用「NK」 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 開始時80ml/hr、60分後160ml/hr 2時間以上かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	5mg/kg 1 袋		●				●			
フィルター付輸液セット			●				●			
＜側管②＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●				●			
【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠 200mg 発熱時 3日分	1 錠		●							
セチリジン塩酸塩錠 10mg かゆい時 3日分	1 錠		●							
アタラックス錠 10mg 医師の指示通り(頓服用)	1 錠		●							

【注射】		投与量\day	29	35	36	42	43	49	50	56
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1 瓶						●			
＜側管①＞ ■インフリキシマブBS 点滴静注用「NK」 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 開始時80ml/hr、60分後160ml/hr 2時間以上かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	5mg/kg 1 袋						●			
フィルター付輸液セット							●			
＜側管②＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶						●			

潰瘍性大腸炎/化療/≤3h