

レジメン名	【ショートハイドレーション】 (尿路上皮癌) ゲムシタピン+シスプラチン	適応	尿路上皮癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

※シスプラチン投与日から3日間 (day1~3) は、1日1000mL以上(推奨:1500mL)の飲水をお願いします。【経口補水液OS-1が推奨される】

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用 点滴注射	1 瓶		●							●			●			
<側管①> デノサリン1500mL/袋 硫酸Mg補正液20mEq・20mL/管 KCL注20mEqキット1mEq/mL 1時間かけて 点滴注射	1 袋 0.5 管 10 mEq		●													
<側管②> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【50】mL/瓶 15分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶 1 瓶		●													
<側管③> デノサリン1500mL/袋 1時間かけて 点滴注射	1 袋		●													
<側管④> day 8, 15は<側管②> ■ゲムシタピン点滴静注用「ヤルト」 (ジェムギタール)(200/1000) ブドウ糖液【5%1000mL】/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	1000mg/m2 1 瓶		●							●			●			
<側管⑤> マンニトール注射液20%/300mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶		●													
<側管⑥> ■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (シスプラチン)(10/25/50) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	70mg/m2 1 袋		●													
<側管⑦> デノサリン1500mL/袋 KCL注20mEqキット1mEq/mL 1時間かけて 点滴注射	1 袋 10 mEq		●													
<側管⑧> デノサリン1500mL/袋 1時間かけて 点滴注射	1 袋		●													
<側管①> Day 8, 15のみ デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 瓶									●			●			
<側管③> Day 8, 15のみ 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶									●			●			
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28	
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2 錠			●	●	●										
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28	
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1 錠		●													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食 後	1 錠			●	●											

肺/化療/7h≤

肺/化療/≤2h

肺/化療/≤2h