

レジメン名	(食道癌) F P 補助化学療法	適応	食道癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	2

【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
<b>&lt;&lt;主管①&gt;&gt;</b> 生理食塩液【100】mL/瓶 ルートキープ用 点滴注射	1 瓶	●	●	●	●	●								
<b>&lt;側管A①&gt;</b> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/管 デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶 1 瓶	●												
<b>&lt;側管A②&gt;</b> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●												
<b>&lt;側管A③&gt;</b> <b>■シスプラチン点滴静注「マルコ」</b> <b>(フリプラチン) (10/25/50)</b> テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	80mg/m2 1 袋	●												
<b>&lt;側管B①&gt;</b> <b>■フルオウラシル注(5-FU)</b> ソリュゲン【G】注 500mL(ガイーンD) メトクロプラミド注射液 10mg・2mL/管 24時間かけて day1は側管A③と同時に開始 day2, 3は側管A④と同時に開始 day4, 5は単独で開始 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	800mg/m2 3 瓶 3 管	●	●	●	●	●								
<b>&lt;側管A④&gt;</b> YDソリタT3 500mL メトクロプラミド注射液10mg・2mL/管 ビタメジン静注用 2時間かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶	●	●	●										
<b>&lt;側管A⑤&gt;</b> ソリュゲン【F】注 500mL(ガイーンF) フロセミド注 20mg・2mL/管 3時間かけて 点滴注射	1 瓶 0.5 管	●	●	●										
<b>&lt;側管②&gt;</b> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶					●								

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
<b>アプレピタントカプセル 125mg</b> 1日1回 点滴の60~90分前	1 C	●												
<b>アプレピタントカプセル 80mg</b> 1日1回 朝 食後	1 C		●	●										
<b>デカドロン錠 4mg</b> 1日2回 朝 夕 食後 2日目~4日目に服用	2 錠		●	●	●									

食/化療/10h≦