

レジメン名	(悪性リンパ腫) R-CHOP 1日	適応							悪性リンパ腫										
		1クール日数							21日										
		上限クール数							6										
【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8				14	15			21	
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射		1 瓶	●																
<側管①> 水溶性プレドニン50mg/管 生理食塩液【50】mL/瓶 10分かけて 点滴注射		2 管 1 瓶	●																
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●																
<側管③> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調製 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に 50mg/hrずつ上げて最大400mg/hrまで。 2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微 であれば100mg/hrで開始し、30分毎に 100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製)		375mg/m2 0.001 mL	●																
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●																
<側管⑤> アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【50】mL/瓶 10分かけて 点滴注射		1 瓶 1 瓶	●																
<側管⑥> ■オンコピン注(1)▼限定 生理食塩液【50】mL/瓶 1回2mg限度 5分かけて 抗癌剤静脈内注射 (薬剤調製)		1.4mg/m2 1 瓶	●																
<側管⑦> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●																
<側管⑧> ■アドリアシン注(10)▼限定 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製)		50mg/m2 1 瓶	●																
<側管⑨> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●																
<側管⑩> ■エンドキサン注(100/500) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 90分かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) *閉鎖式		750mg/m2 1 袋	●																
<側管⑪> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●																
【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8				14	15			21	
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)		2 錠	●																
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)		3 錠	●																
アロプリノール錠 100mg 1日3回 朝 昼 夕 食後		3 錠	●	●	●														
ラベプラゾールNa錠 10mg 1日1回 夕 食後		1 錠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プレドニゾン錠【5】mg 1日2回 朝 夕 食後		20 錠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

アロプリノール、ラベプラゾールは主治医の判断

血/化療/≦7h