

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ+Weeklyパクリタキセル	適応		乳癌								
		1クール日数	上限クール数	28日	なし							
【注射】		投与量\day		1	7	8	14	15	21	22	28	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/管 キープ用 中心静脈注射	1 瓶	●				●					●	
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(デカドロン) ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射	1 瓶 1 管 1 瓶	●				●			●			
<側管②><側管①(day22)> ■トラスツズマブBS点滴静注用(60/150) 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は2時間かけて 2回目以降は忍容性が良好であれば1時間から30分かけて 60mg ^ハ イアルは3.0mL、150mg ^ハ イアルは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)	初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2 管 1 袋	●				●			●		●	
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1 瓶	●				●			●			
<側管④> ■パクリタキセル注射液(タソール) (30/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて(忍容性が良好であれば1時間で投与可) 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)	80mg/m2 1 瓶	●				●			●			
フィルター付輸液セット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<側管⑤><側管②(day22)> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1 瓶	●				●			●		●	
【内服】		投与量\day		1	7	8	14	15	21	22	28	
フロベン錠 40mg セレスターナ配合錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服	1 錠 1 錠	●				●			●		●	
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) 早急 パクリタキセル投与30分前に内服	5 錠	●				●			●			

乳/化療/≤5h 乳/化療/≤5h 乳/化療/≤5h 乳/化療/≤3h