

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ	適応	乳癌
		1クール日数	7日
		上限クール数	なし

※ 化学療法薬と併用の場合はトラスツズマブを最初に投与する。

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●						
<側管①> <b>■トラスツズマブBS点滴静注用</b> <b>(60/150)</b>  注射用水【20】mL/管 <b>テルモ生食【250】mL/袋(点滴用)</b> 初回 90分かけて 2回目以降は忍容性が良好であれば1時間から 30分かけて 60mg <sup>ハ</sup> イアルは3.0mL、150mg <sup>ハ</sup> イアルは7.2mLの注射用 水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg ----- 1~2 管 1 袋								
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●						
【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7
フロベン錠 40mg セレスターナ配合錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服	1 錠 1 錠		●						

乳/化療/≤2h