

レジメン名	(多発性骨髄腫)KRd療法 13クール目以降	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	8	9	15	16	22	23	28
<<主管①>> 5%ブドウ糖液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●	●				●	●		
<側管①> ■カiproリス点滴静注用 (10/40) 27mg/m ² 1瓶 1瓶 注射用水【100】mL/瓶 5%ブドウ糖液【50】mL/瓶 10分かけて 1バイアルあたり20mL(40mg製剤)もしくは 5mL(10mg製剤)の注射用水で溶解し、必要量を 5%ブドウ糖液へ希釈する。 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)閉鎖式	27mg/m ² 1瓶 1瓶		●	●				●	●		
<側管②> 5%ブドウ糖液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●	●				●	●		

【内服】		1	2	8	9	15	16	21	22	23	28	
レナデックス錠 4mg 1日1回 朝食後	10錠	●		●		●			●			
レブラミドカプセル5mg 1日1回 朝食後	5錠	●	→									

day1のレナデックス錠、レブラミドカプセルは院内処方