

レジメン名 (中枢神経系原発悪性リンパ腫) HD-MTX Day 0~Day 1	適応	中枢神経系原発悪性リンパ腫
	1クール日数	21日
	上限クール数	3クール

Ccr < 30mL/min の場合は適用不可

使用禁忌薬剤: NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤 (フロセミド, チアジド系)
 フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム
 テトラサイクリン, シプロフロキサシン など

Day6までのレジメンです。1/4枚目

メイロンとロイコポリンは配合不可

★メソトレキセート血中濃度測定: Day2~Day4 10時 次を示す値を下回ること
 ⇒ 24hr値: 1×10^{-5} mol/L (10 μM) ・ 48hr値: 1×10^{-6} mol/L (1 μM) ・ 72hr値: 1×10^{-7} mol/L (0.1 μM)
 ★測尿 および 尿 pH チェックは頻回に Day1~Day3 まで

【注射】	投与量 \ day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 18時~24時 点滴注射	1瓶 2管 1管		●																				
<<主管①>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 0時~6時 点滴注射	1瓶 2管 1管			●																			
<<主管②>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 6時~10時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管①> ダイアモックス注射用 500mg 生理食塩液【20】mL/管 9時 静脈注射	1瓶 1管			●																			
<側管②> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶 (ﾎﾞﾙﾄﾞ) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 (ﾎﾞﾙﾄﾞ) アロキシ注射液 0.75mg/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1瓶 1瓶			●																			
<<主管③>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 10時~14時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管③> ■注射用メソトレキセート (200mg・1g) YDソリタ T3 500mL 10時~13時 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製)	3.5g/㎡ 1瓶			●																			
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶			●																			
<<主管④>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 14時~18時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<<主管⑤>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 18時~21時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<<主管⑥>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 21時~24時 点滴注射	1瓶 2管			●																			

レジメン名 (中枢神経系原発悪性リンパ腫) HD-MTX Day 2	適応	中枢神経系原発悪性リンパ腫
	1クール日数	21日
	上限クール数	3クール

使用禁忌薬剤：NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤 (フロセミド, チアジド系)
 フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム
 テトラサイクリン, シプロフロキサシン など

Day6までのレジメンです。2/4枚目 **メイロンとロイコボリンは配合不可**

★メトトレキサート血中濃度測定:Day2~Day4 10時 次を示す値を下回ること
 ⇒ 24hr値: 1×10^{-5} mol/L (10 μM) ・ 48hr値: 1×10^{-6} mol/L (1 μM) ・ 72hr値: 1×10^{-7} mol/L (0.1 μM)
 ★測尿 および 尿 pH チェックは Day1~Day3 まで

【注射】	投与量\day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 ファモチジン静注20mg・20mL/管 0時~6時 点滴注射	1瓶 2管 1管			●																			
<<主管②>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 6時~10時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管①> ダイアモックス注射用500mg 生理食塩液【20】mL/管 9時 静脈注射	1瓶 1管			●																			
<<主管③>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 10時~14時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管②> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<側管③> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 10時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管			●																			
<側管④> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<<主管④>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 14時~18時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管⑤> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<側管⑥> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 14時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管			●																			
<側管⑦> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<<主管⑤>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 18時~21時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管⑧> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<側管⑨> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 18時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管			●																			
<側管⑩> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<<主管⑥>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 21時~24時 点滴注射	1瓶 2管			●																			
<側管⑪> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			
<側管⑫> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 22時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管			●																			
<側管⑬> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管			●																			

レジメン名 (中枢神経系原発悪性リンパ腫) HD-MTX Day 3	適応	中枢神経系原発悪性リンパ腫
	1クール日数	21日
	上限クール数	3クール

使用禁忌薬: NSAIDs, プロトンポンプ阻害剤, 利尿剤 (フロセミド, チアジド系)
 フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム
 テトラサイクリン, シプロフロキサシン など

Day6までのレジメンです。3/4枚目

メイロンとロイコボリンは配合不可

★メトトレキサート血中濃度測定: Day2~Day4 10時 次を示す値を下回ること
 ⇒ 24hr値: 1×10^{-5} mol/L (10 μM) ・ 48hr値: 1×10^{-6} mol/L (1 μM) ・ 72hr値: 1×10^{-7} mol/L (0.1 μM)
 ★測尿 および 尿 pH チェックは Day1~Day3 まで

【注射】	投与量 \ day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 0時~6時 点滴注射	1 瓶 2 管 1 管				●																		
<側管①> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<側管②> ロイコボリン注 3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 2時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5 管 1 管				●																		
<側管③> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<<主管②>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 6時~12時 点滴注射	1 瓶 2 管				●																		
<側管④> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<側管⑤> ロイコボリン注 3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 6時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5 管 1 管				●																		
<側管⑥> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<側管⑦> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<側管⑧> ロイコボリン注 3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 10時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5 管 1 管				●																		
<側管⑨> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<<主管③>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 12時~18時 点滴注射	1 瓶 2 管				●																		
<側管⑩> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<側管⑪> ロイコボリン注 3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 16時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5 管 1 管				●																		
<側管⑫> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<<主管④>> YDソリタ T3 500mL メイロン静注 8.4% 20mL/管 18時~24時 点滴注射	1 瓶 2 管				●																		
<側管⑬> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		
<側管⑭> ロイコボリン注 3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 22時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5 管 1 管				●																		
<側管⑮> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1 管				●																		

レジメン名 (中枢神経系原発悪性リンパ腫) HD-MTX Day4~Day6	適応	中枢神経系原発悪性リンパ腫
	1クール日数	21日
	上限クール数	3クール

使用禁忌薬剤：NSAIDs, プロトンポンプインヒビター, 利尿剤 (フロセミド, チアジド系)
 フェニトイン, スルファメトキサゾール・トリメトプリム, ピペラシリンナトリウム
 テトラサイクリン, シプロフロキサシン など

Day6までのレジメンです。4/4枚目 **メイロンとロイコボリンは配合不可**

★メトトレキサート血中濃度測定:Day2~Day4 10時 次を示す値を下回ること
 ⇒ 24hr値: 1×10^{-6} mol/L (10 μM) ・ 48hr値: 1×10^{-6} mol/L (1 μM) ・ 72hr値: 1×10^{-7} mol/L (0.1 μM)
 ★測尿 および 尿 pH チェックは Day1~Day3 まで

【注射】	投与量\day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 ファモチジン静注20mg・20mL/管 0時~6時 点滴注射	1瓶 2管 1管					●	●																
<側管①> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●	●																
<側管②> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 4時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管					●	●																
<側管③> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●	●																
<<主管②>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 6時~12時 点滴注射	1瓶 2管					●	●																
<側管④> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●	●																
<側管⑤> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 10時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管					●	●																
<側管⑥> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●	●																
<<主管③>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 12時~18時 点滴注射	1瓶 2管					●	●																
<側管⑦> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●																	
<側管⑧> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 16時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管					●																	
<側管⑨> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●																	
<<主管④>> YDソリタT3 500mL メイロン静注8.4% 20mL/管 18時~24時 点滴注射	1瓶 2管					●	●																
<側管⑩> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●																	
<側管⑪> ロイコボリン注3mg/1mL/管 生理食塩液【20】mL/管 22時 静脈注射 主管止めて投与。前後フラッシュ	5管 1管					●																	
<側管⑫> 生理食塩液【20】mL/瓶 フラッシュ用 静脈内注射	1管					●																	
<<主管⑤>> YDソリタT3 500mL 24時間キープ 点滴注射	1瓶							●															