

レジメン名	(大腸癌) ベバシズマブ+mFOLFOX6	適応	大腸癌
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

一次治療（術後補助療法を除く）：……………5mg/kg
 二次治療/前治療からの変更理由：増悪以外（副作用、患者希望）……………5mg/kg
 二次治療/前治療からの変更理由：増悪による変更……………10mg/kg

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管①> ■アバステン点滴静注用 (100/400) 生理食塩液【100】mL/瓶 90分かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）	mg/kg 1瓶		●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用	1瓶		●													
<側管③> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ラモセトロン注射液 0.3mg・2mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射	1瓶 1管 1瓶		●													
<側管④> ■オキサリプラチン注（50/100） デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）	85mg/m ² 1管 1瓶		●													
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用	1瓶		●													
<<主管②>> ■レボホリナート点滴静注用 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 主管①と付け替え、側管④と同時に開始 中心静脈注射（薬剤部調製）	200mg/m ² 1瓶		●													
<側管⑥> ■フルオロウラシル注（5-FU） 主管②側管④終了後 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）	400mg/m ²		●													
<側管⑦> ■フルオロウラシル注（5-FU） 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入（薬剤調製）	2400mg/m ² 0.6瓶		●●													
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用	1管		●													
パリンロック用シリンジ 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射	1筒		●													
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2錠			●	●											

腸/化療/≤5h