

レジメン名	(大腸癌) アフリベルセプトβ+FOLFIRI	適応	大腸癌
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
《主管①》	生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射	1瓶	●													
<側管①>	デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・1mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液 50mL 15分かけて 中心静脈注射	1管 1瓶 1瓶	●													
<側管②>	生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶	●													
<側管③>	■ザルトラップ点滴静注 (100/200) テルモ生食【250】mL/袋 60分かけて 抗癌剤中心静脈注射 (薬剤調製)	4mg/kg 1袋	●													
フィルター付輸液セット			●													
<側管④>	生理食塩液【50】mL/瓶 15分かけて 経過観察用(1時間かけて:省略可) フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶	●													
<側管⑤>	■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「イリテカ」 (40/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射 (薬剤調製)	150mg/m <sup>2</sup> 1瓶	●													
<側管⑥>	生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶	●													
《主管②》	■レボホリナート点滴静注用 (25/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 主管①と付け替え、側管⑤と同時に開始 中心静脈注射 (薬剤部調製)	200mg/m <sup>2</sup> 1瓶	●													
<側管⑦>	■フルオロウラシル注 (5-FU) 主管②側管⑤終了後 抗癌剤中心静脈注射 (薬剤調製)	400mg/m <sup>2</sup>	●													
<側管⑧>	■フルオロウラシル注 (5-FU) 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入(薬剤部調製)	2400mg/m <sup>2</sup> 0.6瓶	●	●												
	生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 中心静脈注射	1管	●													
	ハピリンコック用シリンジ 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射	1筒	●													

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠	●														
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1錠		●	●												