

レジメン名	(大腸癌) セツキシマブ+イリノテカン 2週間隔投与2クール目以降	適応	大腸癌
		1クール日数	49日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1			7	8			14	15	16	17		21	22			28	29				35	36			42	43		49	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●				●				●					●				●					●				●			
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶 1瓶		●								●									●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●								●									●												
<側管③> ■アービタックス注射液(100) テルモ生食【250】mL/袋 1時間かけて 7-ビ'タックス投与後1時間経過観察 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	250mg/m2 1袋		●				●				●					●				●					●				●			
<側管④> 生理食塩液【100】mL/瓶 経過観察用 1時間かけて 点滴注射	1瓶		●								●									●												
<側管⑤> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注「40/100」 テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 90分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	150mg/m2 1袋		●								●									●												
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●				●				●					●				●					●				●			
【内服】		投与量\day	1				7	8			14	15	16	17		21	22			28	29				35	36			42	43		49
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) 早急 アービタックス開始60分前までに内服	5錠		●				●				●					●				●					●				●			
アプレビタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C		●								●									●												
アプレビタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1C		●	●							●	●								●	●											