日本	レジメン名 (乳癌) FEC (500/60/500)										適応					乳癌				
(主幹①》 《主管①》 《主管①》 《主管①》 《主管①》 《主管①》 【注解数 [1 0 0] mL/瓶 キーブ用 点滴注射 〈側管①> デキサート注射液 [3 3] mc·1ml.(管(デカ) 1 無 プロキシ注射液 [3 3] mc·1ml.(管(デカ) 1 管 生理食塩液 [1 0 0 mL/瓶 30分かけで 点滴注射 《側管②> 生理食塩液 [5 0] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 〈側管③> ■エピルビシン塩酸塩注射用「NK (フォルドン) (10/50)	レンメン名 (乳)	嵒) F E C (5 C	FEC (500/60/500)								1クール日数						21日			
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 1瓶 (例管①) 1瓶 (売前注射 (5.6 l mg·lmL/照(デカ 1 瓶 7キサート注射液 (3.3) mg·lmL/管(デカ 1 瓶 7キサート注射液 (3.3) mg·lmL/管(デカ 1 瓶 7キサート注射液 (3.3) mg·lmL/版 1 瓶 7ラッシュ用 (点滴注射 (例管②) 1 元 (例管②) 1 元 (例管②) 1 元 (例管②) 1 元 (例管③) 1 元 (例管②) 1 元 (例管②) 1 元 (例管②) 1 元 (別 (100/500) 1 元	F33.417																			
生理食塩液 [100] mL/瓶 1 瓶 - 一		投与量∖day	1						7	8	4	Н	-	14	15	+	+	21		
キープ用		1 4-																		
点滴注射 《側管①> デキサート注射液 [6,6] mg·lmL/瓶(デカ		1	•																	
(側管①) デキサート注射液 [6.6] mg·lm/瓶(デカ 1 瓶 1 管 中 1 注射液 [3.3] mg·lm/管(デカ 1 管 里 2 直																				
デキサート注射液 [3.3] mg·ImL/瓶(デ)カアロキシ注射液 [3.3] mg·ImL/管(デカアロキシ注射液 [3.3] mg·ImL/管(デカアロキシ注射液 [0.75mg/管 1管 1管 生理食塩液 [0.0mg/版 1 版 2 mg/注射 (個管②)												H				+	+	+		
デキサート注射液 (3.3 mg・ImL/管(デカ) 1 管 1 管 1 照 30分かけて 点滴注射		版 (f * h 1 # 版																		
プロキシ注射液 0.75mg/管 生理食塩液100mL/瓶																				
生理食塩液 100mL/瓶 30分かけて 点滴注射 (側管②) と理食塩液 [50] mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射 (例管③) ■エピルビシン塩酸塩注射用「NK (フルドピシン塩酸塩注射用「NK (フルドピシン塩酸塩注射用「NK (フルドピシン塩酸塩注射 (素剤調製) (側管⑤) と生理食塩液 [50] mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑤) ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) (側管⑥) と理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑥) と理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (型筒⑥) は 1 瓶 フラッシュー 原道注射 (型筒⑥) は 1 瓶 フラッシュー 原道注射 (型筒⑥) は 1 瓶 2 間 1 瓶 フラッシュー 原道注射 (型筒⑥) は 1 瓶 2 間 1 瓶 フラッシュー 原道注射 (型筒⑥) は 1 瓶 2 間 1 瓶 2 間 1 種 2 3 4 5 6 7 8 14 15 12 21 [内服] 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 12 21 [内服] 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 15 12 21 [内服] 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 15 12 21			•																	
30分かけて 点滴注射 (側管②) (型) (T) (T																				
点滴注射 <側管②> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管③> ■エピルビシン塩酸塩注射用「NK (フルドルビシン 塩酸塩注射用「NK (フルドルビシン 塩酸塩注射用「NK (フルドルビシン 塩酸塩注射用「NK (フルドルビシン 塩酸塩注射用「NK (フルドルビシン 塩酸塩注射用「NK (フルドル ラン・ ロー) ボール 全開で④> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑤> ■エンドキサン注 (100/500)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,2																		
 (側管②) 生理食塩液 (50) mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管③) (側管③) 大塚糖液 (5% 100mL / 瓶 全棚管④) (側管④) 世エンドキサン注 (100/500) 1 瓶 ラッシュ用 点滴注射 (100/500) 1 袋 2 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) (埋管⑤) 生理食塩液 (50] mL/瓶																				
□ フラッシュ用 点滴注射 ②側管②> ● エピルビシン塩酸塩注射用「NK (フルトルビシン塩酸塩注射用「NK (フルトルビシンは酸塩注射用「NK (全開で) ・ 性理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑤> ● エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> 上理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> 上球機変 [5% 250mL]/瓶 2時間かけて 抗癌剤。溶注射 (薬剤調製) <側管⑦> 単理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (製管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (製管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (製管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射												П				T	П			
□ フラッシュ用 点滴注射 ②側管②> ● エピルビシン塩酸塩注射用「NK (フルトルビシン塩酸塩注射用「NK (フルトルビシンは酸塩注射用「NK (全開で) ・ 性理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑤> ● エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> 上理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> 上球機変 [5% 250mL]/瓶 2時間かけて 抗癌剤。溶注射 (薬剤調製) <側管⑦> 単理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (製管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (製管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (製管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (関管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1 瓶																		
 【 (側管③)> ★定用ルビシン塩酸塩注射用「NK (77ルモルビシン塩酸塩注射用「NK (77ルモルビシン塩の (10 / 50)) 大塚糖液 [5% 100mL]/瓶 全開で			•																	
■エピルビシン塩酸塩注射用「NK (ファルドン) (10/50) 大塚糖液 [5% 100mL] /瓶 全開で 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) 《側管⑤> ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけで 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) 《側管⑥> 生理食塩液 [50] mL/瓶	点滴注射																			
(77ルモルビ・シン) (10/50) 大塚糖液【5% 100mL】/瓶 全開で 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) く側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 く側管⑤> 全時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) く側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 く側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけで シープルオロウラシル注(5-FU) 1 瓶 2 は は は は は は は は は は は は は は は は は は は																	П			
大塚糖液 [5% 100mL] /瓶 全開で 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑤ > ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥ > 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑥ > 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用		月「NK」 60mg/㎡																		
大塚糖液 [5% 100mL] /瓶 全開で 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑤ > ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥ > 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑥ > 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用																				
 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 生理食塩液 [50] mL/瓶	大塚糖液【5% 100mL】/瓶	1 瓶	•													Ш	Ш			
〈側管④〉 生理食塩液【50】mL/瓶 ¬ラッシュ用 点滴注射 〈側管⑤〉 ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 〈側管⑥〉 生理食塩液【50】mL/瓶 ¬ラッシュ用 点滴注射 〈側管⑦〉 ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 1 瓶 ②時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 〈側管⑧〉 生理食塩液【素の】mL/瓶 1 瓶 ②時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 〈側管⑧〉 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 ②時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 〈側管⑧〉 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 ②時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 〈側管⑧〉 生理食塩液【50】mL/瓶 2 部 ②前 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 12 21 デカドロン錠 4 mg	全開で															Ш	Ш			
生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑤)> ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) (側管⑥)> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑦)> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液 [5% 250mL]/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) (側管⑧)> 生理食塩液 (素の) mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑧)> 生理食塩液 (素の) mL/瓶 フラッシュ用 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) (側管⑧) (側管⑧) 生理食塩液 (素の) mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (内服) 「カドロン錠 4mg 1	抗癌剤点滴注射(薬剤調製)															Ш	Ш			
フラッシュ用 点滴注射 <側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 1瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	<側管④>															П	П			
(点滴注射 (側管⑤)> ■エンドキサン注 (100/500)	生理食塩液【50】m L/瓶	1 瓶																		
 【100/500) デノサリン1 500mL/袋 1袋 1袋 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 「100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) (側管⑦> 一フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液 [5% 250mL]/瓶 1瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) 生理食塩液 [50] mL/瓶 7ラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 瓶			•																	
■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液 [5% 250mL]/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 「内服] 1																Ш	Ш			
(100/500) デノサリン 1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑦> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 瓶 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 デカドロン錠 4 mg 2 錠																П	П			
デノサリン1 500mL/袋 1 袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 1 瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 粒 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 デカドロン錠 4 mg		500mg/m²														Ш	Ш			
2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 瓶	(100/500)															Ш	Ш			
 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) (側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 (側管⑦> プルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) (側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 粒 2 3 4 5 6 7 8 14 15 121 デカドロン錠 4 mg 	デノサリン1 500m L/袋	1 袋	•													Ш	Ш			
〈側管⑥〉 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 ◆ 1 瓶 フラッシュ用 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 〈側管⑧〉 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 瓶 2 3 4 5 6 7 8 14 15 121 デカドロン錠 4mg	2時間かけて															Ш	Ш			
生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 【内服】 1																				
フラッシュ用 点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】																	П			
点滴注射 <側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1		1 瓶																		
■ フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <(側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 「カドロン錠 4 mg 500mg/m 1 瓶 1 瓶 2 3 4 5 6 7 8 14 15 1 21 7 15 1 21 7 15 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•																	
■フルオロウラシル注 (5-FU) 大塚糖液 [5% 250mL] /瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液 [50] mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 デカドロン錠 4 mg												Ш				Ш	Ш			
大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 【内服】 1																Ш	Ш			
2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) <側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射 1 瓶 2 3 4 5 6 7 8 14 15 121 【内服】 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 121 デカドロン錠 4 mg 2 錠																Ш	Ш			
抗癌剤点滴注射(薬剤調製) (側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 は滴注射 【内服】 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 12 21 デカドロン錠 4 mg 2 錠		1 瓶	ľ													Ш	Ш			
<側管®> 生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射 1 2 3 4 5 6 7 8 1 14 15 1 21 でカドロン錠 4 mg 2 錠																	Ш			
生理食塩液【50】mL/瓶 1 瓶 フラッシュ用 点滴注射 1 2 3 4 5 6 7 8 1 14 15 1 21 デカドロン錠 4 mg 2 錠												Ц				Щ	Щ			
フラッシュ用 点滴注射 1 2 3 4 5 6 7 8 1 14 15 1 21 デカドロン錠 4 m g 2 錠																				
点滴注射 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1		1 瓶	•																	
【内服】 1 2 3 4 5 6 7 8 1 14 15 1 21 デカドロン錠 4 mg 2 錠 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			1																	
デカドロン錠 4 m g 2 錠													L			Щ	╧			
			1	2	3	4	5	6	7	8				14	15		П	21		
1日2回 朝 タ 食後											T	П	T			П	\prod			
				_								Ц				Ш	Щ			
アプレピタントカプセル 125mg 1 C		_																		
1日1回 点滴の60~90分前												Ш				Ш	Ш			
アプレピタントカプセル 80mg 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	1									T				\prod	1			
1日1回 朝 食後	1日1回 朝 食	後														Ш	Ш			

乳/化療/≦5h