

レジメン名	(胆道癌) GC 療法	適応	胆道癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8				14	15				21	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用 点滴注射	1瓶		●							●										
<<側管①>> テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 点滴注射	1袋		●							●										
<側管②> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液100mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1管 1管 1瓶 1瓶		●							●										
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 前投薬の後 点滴注射	1瓶		●							●										
<側管④> ■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (ブリアラチン)(10/25/50) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 60分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	25mg/m2 1袋		●							●										
<<側管⑤>> テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 点滴注射	1袋		●							●										
<側管⑥> ■ゲムシタピン点滴静注用「ヤルト」 (ジエムザール)(200/1000) ブドウ糖液【5%100mL】/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	1000mg/m2 1瓶		●							●										
<側管⑦> マンニトール注射液 20%・300mL/瓶 1時間かけて 点滴注射	1瓶		●							●										
<<側管⑧>> YDソリタT3 500mL 1時間かけて 点滴注射	1袋		●							●										

胆/化療/&lt;6h

胆/化療/&lt;6h

【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8				14	15				21	
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C		●							●										
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回朝 食後	1C			●	●						●	●								