

レジメン名	(膀胱) Weekly アブラキサン+ゲムシタビン	適応	膀胱癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1					7	8						14	15					21	22					28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●						●							●											
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1瓶		●						●							●											
<側管②> ■アブラキサン点滴静注用 (アルブミン懸濁型パクリタキセル) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製) 注意:投与時インラインフィルターを使用しないこと ※調製は、100mgあたり20mLで溶解。(溶解後は生食等に混和しないこと。)	125mg/m2 1瓶		●						●							●											
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●						●							●											
<側管④> ■ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」 (200/1000)(ジエムザール) ブドウ糖液【5%100】mL/瓶 30分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	1000mg/m2 1瓶		●						●							●											
<側管⑤> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●						●							●											

膀胱/化療/≤2h