

レジメン名	(大腸癌) FOLFIRI	適応	大腸癌
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカト) デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管(デカト) アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射	1管 1管 1管 1瓶		●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管③> ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイレ」 (40/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射(薬剤調製)	150mg/m ² 1瓶		●													
<主管②> ■レボホリナート点滴静注用 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 側管③と同時に 中心静脈注射(薬剤部調製)	200mg/m ² 1瓶		●													
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射	1瓶		●													
<側管④> ■フルオロウラシル注(5-FU) ②③終了後 抗癌剤静脈内注射(薬剤調製)	400mg/m ²		●													
<側管⑥> ■フルオロウラシル注(5-FU) 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入(薬剤調製)	2400mg/m ² 0.6瓶		●●													
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 静脈内注射	1管		●													
へミロックハ®リンロック用 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 静脈内注射	1筒		●													

腸/化療/≤3h

【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
アブレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C	●														
アブレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後	1C		●	●												