

レジメン名	(乳癌)カルボプラチン+ドセタキセル	適応	進行再発乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8					14	15				21
		<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1 瓶	●															
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 管 1 管 1 瓶 1 瓶	●																	
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 ドセタキセルの前	1 瓶	●																	
<側管③> <b>■ドセタキセル点滴静注(20/80)</b> ブドウ糖液【5%250mL】/瓶 60分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	75mg/m2 1 瓶	●																	
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 ドセタキセルの後 カルボプラチンの前	1 瓶	●																	
<側管⑤> <b>■カルボプラチン注「NK」</b> <b>(50/150/450)</b> テルモ生食【250mL】/袋 60分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	AUC6 1 袋	●																	
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 点滴注射 ルートフラッシュ用 カルボプラチンの後	1 瓶																		

【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8					14	15				21
		アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1 錠	●															
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1 錠		●	●															

乳/化療/≤3h