

レジメン名	(乳癌)ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル	適応		乳癌																	
		1クール日数		21日																	
		上限クール数		なし																	
【注射】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射		1瓶		●																	
<側管①> <b>■パージェタ注(420)</b> テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は1時間かけて 2回目以降は30分 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body 1袋		●																	
<側管②> 生理食塩液【100】mL/瓶 初回は1時間かけて 2回目以降は30分(経過観察用) 点滴注射		1瓶		●																	
<側管③> <b>■トラスツズマブBS点滴静注(60/150)</b> 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は90分かけて 2回目以降は30分 60mgパールは3.0mL、150mgパールは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 1~2管 1袋		●																	
<側管④> 生理食塩液【100】mL/瓶 初回は1時間かけて 2回目以降は30分(経過観察用) 点滴注射		1瓶		●																	
<側管⑤> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(デカトロン) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1瓶 1瓶		●																	
<側管⑥> <b>■ドセタキセル点滴静注(20/80)</b> テルモ糖注5% 500mL/袋 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		75mg/m <sup>2</sup> 1袋		●																	
<側管⑦> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1瓶		●																	
【内服】		投与量\day		1				7	8					14	15					21	
フロベン錠 40mg セレスターナ配合錠(セリタミン錠) 医師の指示通り(頓服用) 早急 パージェタ開始30分前に内服		1錠 1錠		●																	

初回：乳/化療/≤6h

2回目以降：乳/化療/≤4h