

レジメン名	(胃癌) エスワン+シスプラチン+ 腹腔内投与パクリタキセル	適応		胃癌											
		1クール日数	35日												
		上限クール数	なし												
【注射】		投与量\day	1	7	8	9	10	11	14	15	21	22	28	29	35
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶				●										
<側管①> デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 点滴注射	1 袋			●											
<側管②> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 アロキシ注射液 0.75mg/管 生理食塩液【100】mL/瓶 パクリタキセル投与30分前までに投与を終了すること 30分かけて 点滴注射	1 管 1 瓶 1 管 1 管 1 瓶			●											
<側管③> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶			●											
<<主管①>> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 パクリタキセル投与30分前までに投与を終了すること 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶	●								●					
<側管④> ■シスプラチン点滴静注「マル」 (10/25/50) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	60mg/m2 1 袋			●											
<側管⑤> デノサリン1 500mL/袋 メトロプロミド注射液 10mg・2mL/管 2時間かけて 点滴注射	1 袋 2 管			●											
<側管⑥> YDソリタT3 500mL 5時間かけて 点滴注射	1 袋			●											
<側管⑦> ソリュゲン【G】注 500mL(ゲインD) 5時間かけて 点滴注射	1 瓶			●											
<<主管①>> YDソリタT3 500mL 2時間かけて 点滴注射	1 袋				●										
<<主管②>> ソリュゲン【G】注 500mL(ゲインD) 2時間かけて 点滴注射	1 瓶				●										
【腹腔内投与】		投与量\day	1	7	8	9	10	11	14	15	21	22	28	29	35
■パクリタキセル注射液「NK」 (30/100) 生理食塩液バッグ「フソー」【1000】mL/袋 抗癌剤腹腔内注入(薬剤調製)	120mg 1 袋	●			●					●					
フィルター付輸液セット 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 腹腔内注射	1 瓶	●			●					●					
【内服】		投与量\day	1	7	8	9	10	11	14	15	21	22	28	29	35
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) 早急 パクリタキセル投与60分前に内服	5 錠	●			●					●					
【内服】 デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2 錠					●	●	●							
【内服】 アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前 アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食 後	1 C 1 C				●										
【内服】 ■エスワン錠 1日2回 朝 夕 食 後	mg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

エスワン	
体表面積	初回基準量
~1.25m2未満	40mg/回(×2)
1.25m2以上~1.5m2未満	50mg/回(×2)
1.5m2 以上~	60mg/回(×2)

胃/化療/10h≤