

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ 3 週間隔投与	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

※ 化学療法薬と併用の場合はトラスツズマブを最初に投与する。

【注射】	投与量\day	1	7	8	14	15	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 管	●					
<側管①> <b>■ トラスツズマブBS点滴静注 (60/150)</b>  注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回 90分かけて 2回目以降は1時間から30分かけて 60mg <sup>ハ</sup> イアルは3.0mL、150mg <sup>ハ</sup> イアルは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 1~2 管 1袋	●					
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●					

【内服】	投与量\day	1	7	8	14	15	21
フロベン錠 40mg セレスターナ錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服	1 錠 1 錠	●					

乳/化療/≦3h