

レジメン名	(尿路上皮癌) M—V A C	適応	尿路上皮癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	6クール

【注射】		投与量\day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> デノサリン1 500mL/袋 6時間かけて 点滴注射	1袋		●													
<<主管②>> YDソリタT3 500mL 6時間かけて 点滴注射	1瓶		●													
<<主管③>> ソリユゲン【F】注 500mL(ガイソF) 6時間かけて 点滴注射	1瓶		●													
<<主管④>> YDソリタT3 500mL 6時間かけて 点滴注射	1瓶		●													
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1袋		●													
<側管①> デノサリン1 500mL/袋 3時間かけて 点滴注射	1袋		●													
<側管②> <b>■メソトレキセート注(50)▼限定</b> テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 3時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	30mg/m2 1袋		●													
<側管③> デノサリン1 500mL/袋 3時間かけて 点滴注射	1袋		●													
<<主管②>> ソリユゲン【F】注 500mL(ガイソF) キープ 点滴注射	1瓶		●													

レジメン名	(尿路上皮癌) M—V A C	適応	尿路上皮癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	6クール

【注射】		投与量\day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 点滴注射	1袋				●											
<<主管②>> テルモ糖注5% 500mL/袋 2時間かけて 点滴注射	1袋			●												
<<主管③>> テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) ソルメルコート【500】mg/瓶(溶解液付) 2時間かけて 点滴注射	1袋 1瓶			●												
<側管①> アロキシ注射液 0.75mg/管 生理食塩液【100】mL/瓶 主管③と同時に 30分かけて 点滴注射	1管 1瓶			●												
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 主管③~主管④投与中に 静脈内注射	1瓶			●												
<側管③> ■エクザール注射用(10)▼限定 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 主管③~主管④投与中に 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	3mg/m2 1瓶			●												
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 エクザールの後 アドリアシンの前 静脈内注射	1瓶			●												
<側管⑤> ■アドリアシン注(10)▼限定 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 主管③~主管④投与中に 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	30mg/m2 1瓶			●												
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 アドリアシンの後 静脈内注射	1瓶			●												
<側管⑦> フロセミド注 20mg・2mL/管 静脈内注射	2管			●												
<側管⑧> ■シスプラチン点滴静注「マルコ」 (プリプラチン)(10/25/50) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2.5時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	70mg/m2 1袋			●												
<側管⑨> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 シスプラチンの後 静脈内注射	1瓶			●												
<側管⑩> フロセミド注 20mg・2mL/管 静脈内注射	2管			●												
<<主管④>> ソリュゲン【F】注 500mL(ガイーンF) メトクロプラミド注射液10mg・2mL/管 2時間かけて 点滴注射	1瓶 3管			●												
<<主管⑤>> デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 点滴注射	1袋			●												
<<主管⑥>> YDソリタT3 500mL 2時間かけて 点滴注射	1瓶			●												
<<主管⑦>> テルモ糖注5% 500mL/袋 アタラックP注射液【25】mg・1mL/管 2時間かけて 点滴注射	1袋 1管			●												
<<主管⑧>> YDソリタT3 500mL アタラックP注射液【25】mg・1mL/管 2時間かけて 点滴注射	1瓶 1管			●												

レジメン名	(尿路上皮癌) M—V A C	適応	尿路上皮癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	6クール

【注射】		投与量\day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> デノサリン1 500mL/袋 4時間かけて 点滴注射	1袋					●										
<<主管②>> デノサリン1 500mL/袋 4時間かけて 点滴注射	1袋					●										
<<主管③>> YDソリタT3 500mL 4時間かけて 点滴注射	1瓶					●										
<<主管④>> ソリュゲン【G】注 500mL(ガイND) 4時間かけて 点滴注射	1瓶					●										
<<主管⑤>> YDソリタT3 500mL 4時間かけて 点滴注射	1瓶					●										
<<主管⑥>> デノサリン1 500mL/袋 4時間かけて 点滴注射	1袋					●										
<側管> フロセミド注 20mg・2mL/管 6時 投与 静脈内注射	2管					●										
<側管> フロセミド注 20mg・2mL/管 12時 投与 静脈内注射	2管					●										
<側管> フロセミド注 20mg・2mL/管 18時 投与 静脈内注射	2管					●										
<<主管①>> ソリュゲン【F】注 500mL(ガイNF) 2時間かけて 点滴注射	1瓶												●			●
<<主管②>> YDソリタT3 500mL 2時間かけて 点滴注射	1瓶												●			●
<<主管③>> ソリュゲン【F】注 500mL(ガイNF) 2時間かけて 点滴注射	1瓶												●			●
<側管①> ■メソトレキセート注(50)▼限定 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて ③の側管より 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	30mg/m2 1瓶												●			●
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 メソトレキセートの後 エクザールの前 静脈内注射	1瓶												●			●
<側管③> ■エクザール注射用(10)▼限定 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて ③の側管より 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	3mg/m2 1瓶												●			●
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 エクザールの後 静脈内注射	1瓶												●			●
<<主管⑥>> デノサリン1 500mL/袋 9時間かけて 点滴注射	1袋												●			●
<<主管⑦>> デノサリン1 500mL/袋 9時間かけて 点滴注射	1袋												●			●

【内服】		0	1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21	22	28
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1C			●											
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1C				●	●									
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食後 3日目~5日目に服用	2錠				●	●	●								