

レジメン名	(乳癌) パルボシクリブ	適応	乳癌
		1クール日数	-
		上限クール数	なし

①レトロゾールとの併用における投与方法

【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
■イブランスカプセル125mg 1日1回	1 Cap	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→							
■レトロゾール錠2.5mg 1日1回	1 錠	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

以降、イブランスカプセル3投1休・レトロゾール連日投与を繰り返す

②フルベストラントとの併用における投与方法

【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
■イブランスカプセル125mg 1日1回	1 Cap	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→							
【注射】		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
■フェンロデックス筋注 左右殿部に筋注	左右殿部に 250mg1管ずつ	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

2週間間隔

2週間間隔

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

4週間間隔

以降、イブランスカプセル3投1休・フェンロデックス筋注4週間間隔投与を繰り返す