

レジメン名	(大腸癌) パニツムマブ+ FOLFIRI	適応												大腸癌		
		1クール日数												14日		
		上限クール数												なし		
【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
＜＜主管①＞＞ 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
＜側管①＞ ■ベクティビックス点滴静注用 (100) 生理食塩液【100】mL/瓶 60分かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）		6mg/kg 1 瓶	●													
＜側管②＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
＜側管③＞ デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・1mL/管 アロキシ静注 0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液100mL/瓶 30分かけて 中心静脈注射		1 管 1 管 1 瓶 1 瓶	●													
＜側管④＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
＜側管⑤＞ ■イリノテカン塩酸塩点滴静注液「タイレド」 (40/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）		150mg/m ² 1 瓶	●													
＜側管⑥＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 中心静脈注射		1 瓶	●													
＜＜主管②＞＞ ■レボホリナート点滴静注用 (25/100) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 主管①と付け替え、側管⑤と同時に開始 中心静脈注射（薬剤部調製）		200mg/m ² 1 瓶	●													
＜側管⑦＞ ■フルオロウラシル注（5-FU） 主管②側管⑤終了後 抗癌剤中心静脈注射（薬剤調製）		400mg/m ²	●													
＜側管⑧＞ ■フルオロウラシル注（5-FU） 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入（薬剤部調製）		2400mg/m ² 0.6 瓶	●	●												
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 中心静脈注射		1 管	●													
ハナリンロック用シリンジ 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 中心静脈注射		1 筒	●													
フィルター付輸液セット			●													
【内服】			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60～90分前		1 C	●													
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝食後		1 C		●	●											