

レジメン名	(胃癌) Weeklyパクリタキセル	適応	胃癌
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶		●		●		●			
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/管 ファモチジン静注 20mg・20mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 主管①と同時に 30分かけて 点滴注射 パクリタキセル投与30分前までに投与を終了すること	1管 1管 1瓶		●		●		●			
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶		●		●		●			
<側管③> ■パクリタキセル注射液「NK」 (30/100) ブドウ糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて(忍容性が確認できれば1時間で投与可) 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	70mg/m ² 1袋		●		●		●			
フィルター付輸液セット			●		●		●			
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶		●		●		●			
【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) パクリタキセル投与60分前に内服	5錠		●		●		●			

胃/化療/≤3h