

レジメン名	(多発性骨髄腫) DMPB1サイクル (1~6週)	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	42日
		上限クール数	1

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	7	8	11	14	15	21	22	25	28	29	32	35	36	42
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キーブ用 点滴注射	1 瓶		●					●			●		●			●			●	
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	3 瓶 1 瓶		●					●			●		●			●			●	
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●					●			●		●			●			●	
<側管③> ■ダラザレックス点滴静注 (100/400) 生理食塩液バッグ「フソー」【1000】mL/袋 希釈後の総量を1000mLとし、50mL/時で開始する。忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可	16mg/kg 0.001 瓶		●																	
<側管③> ■ダラザレックス点滴静注 (100/400) テルモ生食【500】mL/袋 (点滴用) 希釈後の総量を500mLとし、50mL/時で開始する。忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可	16mg/kg 0.001 袋							●			●		●			●			●	
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●					●			●		●			●			●	
フィルター付輸液セット			●					●			●		●			●			●	
<皮下注射> ■ベルケイド注 (3) 生理食塩液【20】mL/管 1分かけて 1m ³ /7m ³ を生食1.2mLで溶解(2.5mg/mL)とし、必要量抜き取り使用 抗癌剤皮下注射 (薬剤部調製)	1.3mg/m ² 1 管		●		●		●	●					●	●		●		●		

day1→血/化療/≤8h
 day8、15、22、29、36→血/化療/≤5h
 day4、11、25、32→血/化療/≤1h

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	7	8	11	14	15	21	22	25	28	29	32	35	36	42
アルケラン錠2mg 1日1回 経口投与 day1は院内処方、day2~4は院外処方	9mg/m ²		●	●	●	●														
プレドニゾン錠5mg 1日1~2回 経口投与 (院外処方)	60mg/m ²		●	●	●															
カロナール錠200mg レスタミン錠10mg モンテルカスト錠10mg ダラザレックスの1時間前 (院内処方)	2 錠 3 錠 1 錠		●					●			●		●			●			●	

レジメン名	(多発性骨髄腫) DMPB2~9サイクル (7~54週)	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	42日
		上限クール数	8

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	7	8	11	14	15	21	22	25	28	29	32	35	36	42	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶		●										●								
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	3 瓶 1 瓶		●										●								
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●										●								
<側管③> ■ダラザレックス点滴静注 (100/400) テルモ生食【500】mL/袋 (点滴用) 希釈後の総量を500mLとし、50mL/時で開始する。忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可	16mg/kg 0.001 袋		●										●								
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●										●								
フィルター付輸液セット			●										●								
<皮下注射> ■ベルケイド注 (3) 生理食塩液【20】mL/管 1分かけて 1m ³ 17mLを生食1.2mLで溶解 (2.5mg/mL) とし、必要量抜き取り使用 抗癌剤皮下注射 (薬剤部調製)	1.3mg/m ² 1 管		●				●						●			●					

day1、day22→血/化療/≤5h
day8、day29→血/化療/≤1h

【内服】		投与量\day	1	2	3	4	7	8	11	14	15	21	22	25	28	29	32	35	36	42	
アルケラン錠2mg 1日1回 経口投与 day1は院内処方、day2~4は院外処方	9mg/m ²		●	●	●	●															
プレドニゾン錠5mg 1日1~2回 経口投与 (院外処方)	60mg/m ²			●	●	●															
カロナール錠200mg レスタミン錠10mg モンテルカスト錠10mg ダラザレックスの1時間前 (院内処方)	2 錠 3 錠 1 錠		●										●								

レジメン名	(多発性骨髄腫) DMPB10サイクル (55週) 以降	適応	多発性骨髄腫
		1クール日数	28日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量/day		1				7	8			14	15			21	22		25	28	
<主管①> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1 瓶	●																			
<側管①> デキサト注射液【6.6】mg・2mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	3 瓶 1 瓶	●																			
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●																			
<側管③> ■ダラザレックス点滴静注 (100/400) テルモ生食【500】mL/袋 (点滴用) 希釈後の総量を500mLとし、50mL/時で開始する。忍容性が良好であれば、別表の通り希釈後の総量、投与速度を変更可	16mg/kg 0.001 袋	●																			
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●																			
フィルター付輸液セット		●																			
血/化療/≤5h																					
【内服】		投与量/day		1				7	8			14	15			21	22		25	28	
カロナー錠200mg	2 錠	●																			
レスタミン錠10mg	3 錠																				
モンテルカスト錠10mg	1 錠																				
ダラザレックスの1時間前 (院内処方)																					