

レジメン名	(乳癌)トラスツズマブ+ビノレルビン	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day																																									
		1							7							8							14							15							21						
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●														●														●													
<側管①> ■トラスツズマブBS点滴静注用 (60/150) 注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は90分かけて 2回目以降は忍容性が良好であれば 1時間から30分かけて 60mg <sup>ハ</sup> イアルは3.0mL、150mg <sup>ハ</sup> イアルは7.2mLの 注射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2管 1袋	●														●														●													
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●														●														●													
<側管③> ■ナベルピン注(10/40) 生理食塩液【50】mL/瓶 10分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	25mg/m <sup>2</sup> 1瓶	●														●														●													
<側管④> YDソリタ1号【200mL】/袋 デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカト) 1時間かけて 点滴注射 血管痛軽減のため	1袋 1管	●														●														●													

【内服】		投与量\day																																									
		1							7							8							14							15							21						
フロベン錠 40mg セレスターナ配合錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服	1錠 1錠	●														●														●													

乳/化療/≤3h 乳/化療/≤3h 乳/化療/≤2h