

レジメン名 (アキシ・イット)	(乳癌) FEC (500/75/500)	適応		乳癌								
		1クール日数	上限クール数	21日	6クール							
【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21				
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●										
<側管①> デキサート注射液【6.6】mg・1mL/瓶(テ'カト'ロン) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(テ'カト'ロン) アロキシ注射液 0.75mg/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1瓶 1管 1管 1瓶	●										
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●										
<側管③> ■エピルピシン塩酸塩注射液「NK」 (ファルピ'シ'ン)(10/50) 大塚糖液【5% 100mL】/瓶 全開で 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	75mg/m <sup>2</sup> 1瓶	●										
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●										
<側管⑤> ■エンドキサン注 (100/500) デノサリン1 500mL/袋 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	500mg/m <sup>2</sup> 1袋	●										
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●										
<側管⑦> ■フルオロウラシル注(5-FU) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	500mg/m <sup>2</sup> 1瓶	●										
<側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●										
【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食後	2錠		●	●	●							
【内服】		1	2	3	4	5	6	7	8	14	15	21
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1錠	●										
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後	1錠		●	●								

乳/化療/≤5h