

レジメン名	(悪性リンパ腫) リツキシマブ維持療法8週間隔投与	適応	悪性リンパ腫
		1クール日数	56日
		上限クール数	12クール

【注射】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶	●								
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m2 0.001	●								
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶	●								

【内服】		投与量\day	1	7	8	14	15	21	22	28
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠	●								
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠	●								

血/化療/≤5h

【注射】		投与量\day	29	35	36	42	43	49	50	56
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1瓶									
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m2 0.001									
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1瓶									

【内服】		投与量\day	29	35	36	42	43	49	50	56
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2錠									
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3錠									