

レジメン名	(全身性エリテマトーデス) ペリムマブ(ペンリスタ) 初回導入	適応	全身性エリテマトーデス
		1クール日数	56日
		上限クール数	1クール

【注射】		投与量\day		1		7		8		14		15		#		22		28	
<<主管①>> 生食【100】mL/瓶 (点滴用) キープ用 点滴注射	1 瓶	●											●						
<側管①> ■ペンリスタ点滴静注用 (120/400)	10mg/kg 1 袋 1 管	●											●						
生食【250mL】/袋 注射用水【20mL】/管 120mg <sup>ハ</sup> イアル1 <sup>ハ</sup> イアル当たり、1.5mLの注射用水で溶解 400mg <sup>ハ</sup> イアル1 <sup>ハ</sup> イアル当たり、4.8mLの注射用水で溶解 250mLのバッグからペンリスタ溶液の使用量と同量の 生理食塩液を抜きとる。 1時間以上かけて 点滴注射 (薬剤部調製)																			
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●											●						

【注射】		投与量\day		29		35		36		42		43		#		50		56	
<<主管①>> 生食【100】mL/瓶 (点滴用) キープ用 点滴注射	1 瓶	●																	
<側管①> ■ペンリスタ点滴静注用 (120/400)	10mg/kg 1 袋 1 管	●																	
生食【250mL】/袋 注射用水【20mL】/管 120mg <sup>ハ</sup> イアル1 <sup>ハ</sup> イアル当たり、1.5mLの注射用水で溶解 400mg <sup>ハ</sup> イアル1 <sup>ハ</sup> イアル当たり、4.8mLの注射用水で溶解 250mLのバッグからペンリスタ溶液の使用量と同量の 生理食塩液を抜きとる。 1時間以上かけて 点滴注射 (薬剤部調製)																			
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●																	

その他/化療/≤2h