

レジメン名	(大腸癌) mFOLFOX6	適応	大腸癌
		1クール日数	14日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
＜主管①＞ 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 中心静脈注射	1 瓶		●													
＜側管①＞ デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶(デカトロン) ラモセトロン注射液 0.3mg・2mL/管 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶		●													
＜側管②＞ ■オキサリプラチン注(50/100) デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管(デカトロン) 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	85mg/m ² 1 管 1 瓶		●													
＜側管③＞ 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●													
＜主管②＞ ■レボホリナート点滴静注用 大塚糖液【5% 250mL】/瓶 2時間かけて 側管②と同時に 点滴注射(薬剤部調製)	200mg/m ² 1 瓶		●													
＜側管④＞ ■フルオロウラシル注(5-FU) ②③終了後 抗癌剤静脈内注射(薬剤調製)	400mg/m ²		●													
＜側管⑤＞ ■フルオロウラシル注(5-FU) 生理食塩液【50】mL/瓶 46時間かけて インフューザー使用 抗癌剤局所持続注入(薬剤調製)	2400mg/m ² 0.6 瓶		●	●												
生理食塩液【20】mL/管 血管確保用 静脈内注射	1 管		●													
リンロック用シリンジ 500単位・5mL/筒 フラッシュ用 静脈内注射	1 筒		●													
【内服】																
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2 錠			●	●											

腸/化療/≤3h