

レジメン名	(胃癌) 【ショートハイドレーション】 カペシタビン+シスプラチン	適応	胃癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

※シスプラチン投与日から3日間 (day1~3) は、1日1000mL以上(推奨:1500mL)の飲水をお願いします。【経口補水液OS-1が推奨される】

【注射】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 血管確保用・フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●																				
<側管①> デノサリン 1 500mL/袋 KCL注20mEqキット1mEq/mL 1時間かけて 点滴注射	1 袋 0.5 本	●																				
<側管②> デノサリン 1 500mL/袋 硫酸Mg 補正液20mEq・20mL/管 1時間かけて 点滴注射	1 袋 0.5 管	●																				
<側管③> デキサート注射液【6.6】mg・2mL/瓶 デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶 1 管 1 瓶 1 瓶	●																				
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶	●																				
<側管⑤> マンニトール注射液 20%・300mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 瓶	●																				
<側管⑥> ■シスプラチン注「マルコ」 (10/25/50) テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 1時間かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	80mg/m2 1 袋	●																				
<側管⑦> デノサリン 1 500mL/袋 1時間かけて 点滴注射	1 袋	●																				
<側管⑧> デノサリン 1 500mL/袋 KCL注20mEqキット1mEq/mL 1時間かけて 点滴注射	1 袋 0.5 本	●																				

【内服】	投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
■カペシタビン錠 300mg 1日2回 朝 夕 食 後	mg	●														●								
ピドキサル錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食 後	3 錠	●	●	●																				
デカドロン錠 4mg 1日2回 朝 夕 食 後	2 錠		●	●	●																			
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前	1 C	●																						
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食 後	1 C		●	●																				

胃/化療/≤7h

カペシタビン	
体表面積	1回用量
~1.36m2未満	1,200mg/回 (×2)
1.36m2以上~1.66m2未満	1,500mg/回 (×2)
1.66m2以上~1.96m2未満	1,800mg/回 (×2)
1.96m2以上~	2,100mg/回 (×2)