

レジメン名	(大腸癌) セツキシマブ+イリノテカン 2週間隔投与1クール目	適応	大腸癌
		1クール日数	49日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	16	17	21	22	28	29	30	31	35	36	42	43	49	
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射		1 瓶	●				●		●				●		●				●		●		
<側管①> デキサート注射液【3.3】mg・1mL/管 デキサート注射液【1.65】mg・0.5mL/管 アロキシ静注0.75mg・5mL/瓶 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射		1 管 1 管 1 瓶 1 瓶	●							●						●							
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●				●		●				●		●								
<側管③> ■アービタックス注射液(100) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 2時間かけて アービタックス投与後1時間経過観察 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		400mg/m2 1 袋	●																				
<側管③> ■アービタックス注射液(100) テルモ生食【250】mL/袋 1時間かけて アービタックス投与後1時間経過観察 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		250mg/m2 1 袋					●		●			●		●		●		●		●		●	
<側管④> 生理食塩液【100】mL/瓶 経過観察用 1時間かけて 点滴注射		1 瓶	●						●							●							
<側管⑤> ■イリノテカン塩酸塩 点滴静注液「タイナ」 (40/100) テルモ生食【500】mL/袋(点滴用) 90分かけて 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)		150mg/m2 1 袋	●								●					●							
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射		1 瓶	●				●		●				●		●				●		●		●
【内服】		投与量\day	1	2	3	7	8	14	15	16	17	21	22	28	29	30	31	35	36	42	43	49	
レスタミンコーワ錠 10mg 医師の指示通り(頓服用) 早急 アービタックス開始60分前までに内服		5 錠	●				●		●				●		●				●		●		●
アプレピタントカプセル 125mg 1日1回 点滴の60~90分前		1 C	●						●						●								
アプレピタントカプセル 80mg 1日1回 朝 食後		1 C		●	●					●	●					●	●						