

レジメン名	(乳癌) トラスツズマブ+カペシタビンB法	適応	乳癌
		1クール日数	21日
		上限クール数	なし

【注射】		投与量\day		1				7	8					14	15					21
<<主管①>> 生理食塩液【100】mL/瓶 キープ用 点滴注射	1瓶	●							●						●					
<側管①> ■トラスツズマブBS点滴静注用 (60/150)  注射用水【20】mL/管 テルモ生食【250】mL/袋(点滴用) 初回は2時間かけて 2回目以降は1時間 (30分でも投与可能) 60mg <sup>ハ</sup> イアルは3.0mL、150mg <sup>ハ</sup> イアルは7.2mLの注 射用水で溶解 21mg/mLとなる 抗癌剤点滴注射(薬剤調製)	初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 1~2管 1袋	●							●						●					
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1瓶	●							●						●					

【内服】		投与量\day		1				7	8					14	15					21
フロベン錠 40mg セレスターナ錠 医師の指示通り(頓服用) 早急 トラスツズマブ開始30分前に内服	1錠 1錠	●							●						●					
■カペシタビン錠 300「サワイ」 1日2回 朝 夕 食 後	mg	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ピドキサール錠 20mg 1日3回 朝 昼 夕 食 後	3錠	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ピドキサール錠は、主治  
医の判断が必要に応じて 乳/化療/≤3h

カペシタビン	
体表面積	1回用量
~1.33m <sup>2</sup> 未満	1,500mg/回 (×2)
1.33m <sup>2</sup> 以上~1.57m <sup>2</sup> 未満	1,800mg/回 (×2)
1.57m <sup>2</sup> 以上~1.81m <sup>2</sup> 未満	2,100mg/回 (×2)
1.81m <sup>2</sup> 以上~	2,400mg/回 (×2)