

レジメン名	(非ホジキンリンパ腫) FCR <注射>	適応		非ホジキンリンパ腫																					
		1クール日数		28日																					
		上限クール数																							
【注射】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8			14				21				28				
《主管①》 生理食塩液【100】mL/瓶 ケモ用キープ 点滴注射	1 瓶		●	●	●																				
<側管①> ■リツキシマブBS点滴静注「KHK」 テルモ糖注5% 500mL/袋 (mL入力) 5%グルコースは1mg/mLとなるように調整 最初の30分は50mg/hr、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまで。2回目以降は、初期投与時の副作用が軽微であれば、100mg/hrで開始し、30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hr。適宜減速 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	375mg/m ² 0.001 mL		●																						
<側管②> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●																						
<側管③> ラモセトロン注射液 0.3mg・2mL (特A) 生理食塩液【100】mL/瓶 30分かけて 点滴注射	1 管 1 瓶		●	●	●																				
<側管④> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●	●	●																				
<側管⑤> ■フルダラ注(50)▼限定 注射用水20mL 生理食塩液【100】mL/瓶 1mLあたり2.5mLの注射用水で溶解し(20mg/mL)、必要量を生理食塩液に希釈する。 30分かけて 抗癌剤精密持続点滴注射 (薬剤部調製)	25mg/m ² 1 管 1 瓶		●	●	●																				
<側管⑥> 生理食塩液【50】mL/瓶 ルートフラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●	●	●																				
<側管⑦> ■エンドキサン注(500) デノサリン1500mL/袋 1時間かけて 抗癌剤点滴注射 (薬剤部調製)	250mg/m ² 1 袋		●	●	●																				
<側管⑧> 生理食塩液【50】mL/瓶 フラッシュ用 点滴注射	1 瓶		●	●	●																				
【内服】		投与量\day	1	2	3	4	5	6	7	8			14								21				28
カロナール錠【200】mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	2 錠		●																						
レスタミンコーワ錠 10mg リツキシマブ開始30分前 医師の指示通り (頓服用)	3 錠		●																						

血/化療/≤7h
血/化療/≤3h